



PROSECCO SUPERIORE
DAL 1876

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE
1° Bollettino Agronomico del 05/04/2018

Il Protocollo Viticolo edizione 2018 sarà disponibile a breve presso gli uffici del Consorzio di Tutela e verrà recapitato a giorni presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che **è attivo lo Sportello Viticolo con la mail gruppotecnico@prosecco.it e il cell 389 5220220 al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.**

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra riportata l'indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.

In questo periodo alternato da giornate calde e soleggiate e da altre molto perturbate è possibile verificare la fase del pianto della vite e l'ingrossamento delle gemme. In questa fase è possibile intervenire in vigneto contro il complesso del mal dell'esca e contro le cocciniglie, per chi fosse stato interessato da infestazioni nel passato.

Mal dell'esca

L'innalzamento della temperatura media giornaliera al di sopra dei 10°C e la presenza di pianto abbondante sono le due condizioni chiave per l'esecuzione degli interventi a base di *Trichoderma*, prodotti utilizzabili anche in coltivazione biologica.

I microrganismi in questione, una volta distribuiti, colonizzano la superficie dei tagli di potatura impedendo lo sviluppo e l'approfondimento dei funghi patogeni responsabili delle malattie del legno. Di conseguenza è utile ricordare come i prodotti commerciali a base di *Trichoderma* agiscano, perlopiù, in modo preventivo.

Qualunque prodotto commerciale deve essere **pre-germinato in acqua** di pozzo non clorata in rapporto 1:10 (es. 1 kg di prodotto in 10 litri d'acqua) **a temperatura ambiente 24/36 ore prima dell'esecuzione dell'intervento**. Successivamente, l'inoculo preparato deve essere sciolto nell'intero volume di distribuzione.

Rispettando il dosaggio indicato in etichetta dei vari prodotti commerciali, si consiglia l'impiego alla dose di **1 kg/ettaro** con un volume di bagnatura minimo di **400 litri/ettaro**.

Tale quantità è dovuta alla necessità di bagnare bene tutte le ferite eseguite sia su legno vecchio ma anche su legno giovane.

Cocciniglie

L'approccio alla fase di germogliamento offre la possibilità al viticoltore di intervenire contro le cocciniglie, in particolare la cocciniglia del corniolo (*Parthenolecanium corni*) nel caso di importanti infestazioni rilevati nella stagione precedente. I prodotti impiegabili sono quelli a base di **olio minerale** che devono essere distribuiti prima dell'emissione delle punte verdi dei germogli in quanto quest'ultimi possono subire fenomeni di fitotossicità.

L'olio minerale, impiegabile anche in viticoltura biologica, agisce per contatto ricoprendo gli insetti bersaglio impedendone la respirazione causandone la morte. Per questo motivo va distribuito bagnando bene tutta la pianta con un volume di bagnatura non inferiore ai 300 L/ha. Rispettando le dosi e le indicazioni riportate in etichetta si consiglia l'impiego dei prodotti in questione alla dose di 5 L/ettolitro d'acqua.