



**CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE**

## **2° Bollettino Agronomico del 13/04/2018**

Il Protocollo Viticolo edizione 2018 sarà disponibile a breve presso gli uffici del Consorzio di Tutela e verrà recapitato a giorni presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che **è attivo lo Sportello Viticolo con la mail [gruppotecnico@prosecco.it](mailto:gruppotecnico@prosecco.it) e il cell 389 5220220 al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.**

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra riportata l'indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.

### **METEO**

La fase del germogliamento della vite è caratterizzata, in questa annata, da un prolungato periodo di instabilità meteoclimatica con abbondanti e numerose precipitazioni e una flessione delle temperature, specie negli ultimi giorni. Dalla fase di ingrossamento gemme, ovvero dal 20 marzo fino ad oggi sono stati accumulati 130 mm di pioggia nell'area del Valdobbiadenese mentre nei dintorni di Conegliano sono caduti 104 mm. Questi dati confermano come l'inizio di primavera risulti, ad oggi, particolarmente piovoso con circa 30 mm sopra la media storica del periodo.

### **FENOLOGIA**

In buona parte dei vigneti testimone la fase di germogliamento della vite è quasi conclusa, e pertanto nei prossimi giorni potremo assistere all'apertura dell'apice dei germogli.

Solo in alcune zone, quelle tradizionalmente più tardive, i germogli sono ancora in fase BBCH 7 e 8 ovvero a punte verdi. Nella tabella vengono riportati i rilievi fenologici del 12.04.2018 in dettaglio per ogni località:

LOCALITÀ	FENOLOGIA GERMOGLIO
Carpesica	9: il germoglio si espande ma è ancora chiuso
Cartizze	9: il germoglio si espande ma è ancora chiuso
Col San Martino	9: il germoglio si espande ma è ancora chiuso
Colbertaldo	9: il germoglio si espande ma è ancora chiuso
Colfosco	9: il germoglio si espande ma è ancora chiuso
Collalto	9: il germoglio si espande ma è ancora chiuso
Colle Umberto	8:punte dei germogli verdi chiaramente visibili
Combai	7: punte dei germogli verdi appena visibili
Conegliano	9: il germoglio si espande ma è ancora chiuso
Premaor	7: punte dei germogli verdi appena visibili
Refrontolo	10: il germoglio si apre
Rolle	8: punte dei germogli verdi chiaramente visibili
S. Maria di Feletto	10: il germoglio si apre
Soligo	9: il germoglio si espande ma è ancora chiuso
Valdobbiadene	8:punte dei germogli verdi chiaramente visibili

### *Escoriosi*

Le abbondanti precipitazioni verificatesi durante la fase del germogliamento offrono le condizioni perfette al patogeno in questione per infettare i giovani tessuti dei germogli in fase di distensione. Per questo motivo, nei vigneti che lo scorso anno o che storicamente sono interessati da infezioni da parte di escoriosi si consiglia di intervenire con prodotti a base **metiram o propineb o zolfo bagnabile** alla dose di etichetta a concentrazione (kg/ettolitro). Per chi utilizzasse metiram e propineb si ricorda che sono 3 gli interventi ammessi per ciascuna sostanza attiva durante la stagione. Nel caso di interventi esclusivamente cautelativi si consiglia l'impiego di zolfo bagnabile.

Nel caso di vigneti a conduzione biologica è possibile con **zolfo bagnabile** intervenire alla dose di etichetta a concentrazione (kg/ettaro).

Il trattamento deve coprire tutti i giovani germogli in accrescimento, pertanto si consiglia un volume di bagnatura non inferiore ai 200 L/ettaro.