



**PROTOCOLLO  
VITICOLO** DEL  
CONEGLIANO VALDOBBIADENE  
PROSECCO SUPERIORE DOCG

# BOLLETTINO AGRONOMICO

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

## 17/05/2017

Il Protocollo Viticolo edizione 2017 è disponibile da qualche settimana presso gli uffici del Consorzio di Tutela.

Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è **attivo lo Sportello Viticolo con il cell 389 5220220 e la mail [gruppotecnico@prosecco.it](mailto:gruppotecnico@prosecco.it) al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.**

### **METEO**

Per ogni dettaglio, si può consultare il link [http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo\\_veneto.php](http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php) quale fonte dati dei nostri comunicati.

Un promontorio anticiclonico in espansione dall'Africa nord-occidentale verso l'Europa rende il tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Le temperature saranno in aumento, più marcato nei valori massimi con valori sensibilmente superiori alla norma per un periodo piuttosto lungo.

Per accedere alla consultazione delle centraline distribuite all'interno della Denominazione, è possibile inserire il seguente indirizzo sul browser **88.149.188.186/docg/mappa.html**.

**Si ricorda che il nome utente è "docg", mentre la password "d4cg".**



## OSSERVAZIONI IN CAMPO

*Fenologia - situazione al 22.05.2017*

<b>LOCALITÀ</b>	<b>FENOLOGIA GERMOGLIO</b> (foglie spiegate e separate dal germoglio)	<b>NUOVE FOGLIE IN 7 GG</b>	<b>FENOLOGIA GRAPPOLO</b>
Carpesica	13	2	prime caliptre distaccate dal ricettacolo
Cartizze	12	2	rigonfiamento dell'infiorescenza, fiori strettamente appressati l'un l'altro
Col San Martino	12	2	rigonfiamento dell'infiorescenza, fiori strettamente appressati l'un l'altro
Colbertaldo	12	2	rigonfiamento dell'infiorescenza, fiori strettamente appressati l'un l'altro
Colfosco	13	2	prime caliptre distaccate dal ricettacolo
Collalto	12	2	prime caliptre distaccate dal ricettacolo
Colle Umberto	11	1	rigonfiamento dell'infiorescenza, fiori strettamente appressati l'un l'altro
Combai	11	2	rigonfiamento dell'infiorescenza, fiori strettamente appressati l'un l'altro
Conegliano	12	1	rigonfiamento dell'infiorescenza, fiori strettamente appressati l'un l'altro
Premaor	12	3	rigonfiamento dell'infiorescenza, fiori strettamente appressati l'un l'altro
Refrontolo	12	2	inizio della fioritura: 10% di caliptre cadute
Rolle Medio	12	3	rigonfiamento dell'infiorescenza, fiori strettamente appressati l'un l'altro
S. Maria di Feletto	13	2	rigonfiamento dell'infiorescenza, fiori strettamente appressati l'un l'altro
Soligo	12	2	rigonfiamento dell'infiorescenza, fiori strettamente appressati l'un l'altro
Valdobbiadene	11	2	rigonfiamento dell'infiorescenza, fiori strettamente appressati l'un l'altro

**Tab. 1** – Rilievo fenologico effettuato nei vigneti testimone il lunedì 22 maggio 2017.



## ***Peronospora – Plasmopara viticola***

### ***Stima rischio infezione medio***

In relazione all'assenza di piovosità ed al cambio di "passo" osservato nella fioritura è importante intervenire nei giorni dal **29 maggio al 1 giugno**, in base alla data dell'ultimo intervento svolto, con prodotti sistemici indicati alle pagg. 12 e 13 del Protocollo. I principi attivi consigliati in questo frangente sono i seguenti: **Metalaxil o Metalaxil-M** oppure uno dei CAA (**dimetomorph, iprovalicarb, mandipropamide**) in abbinamento con a partners di copertura quali **metiram o propineb o rame**, alla dose per hl indicata in etichetta. Per i vigneti in conduzione biologica si suggerisce un intervento con **poltiglia bordolese** in miscela al 50% con **ossicloruro di rame** alla dose di 600 g/ha di rame metallo.

## ***Oidio – Erysiphe necator***

### ***Stima rischio infezione medio***

Con il rialzo termico, l'umidità relativa elevata e l'infittimento della vegetazione, occorre prestare molta attenzione cercando di non lasciare possibilità di infezione. Per questo motivo, in associazione al trattamento antiperonosporico, si consiglia di posizionare un nuovo intervento a partire da **lunedì 29 maggio** a base delle formulazioni riportate alle pagg. 16 e 17, 18 e 19 (tabella in alto) del Protocollo Viticolo, in particolare IBS (**Tetraconazolo, Penconazolo, Propiconazolo, Febuconazolo, Difeconazolo**) o Strobilurine (**azoxistrobin, tryfloxistrobin, Pyraclostrobin**), abbinati a zolfo come partner di copertura. Per le aziende in conduzione biologica si consiglia l'uso di **zolfo micronizzato** alla dose di 600 g/hl. Nella scelta delle sostanze attive tenere in debita considerazione le limitazioni sancite dal protocollo viticolo, sia per quanto riguarda la possibilità di utilizzo che il numero massimo di interventi previsti per ciascuna di esse.

## ***GESTIONE IN VERDE***

Visto l'accrescimento della vite e la ripresa delle temperature si consiglia di terminare i lavori di scacchiatura e iniziare con i lavori di convogliamento della vegetazione al fine di colpire adeguatamente la vegetazione con i trattamenti fitosanitari. Negli ultimi giorni, sui vigneti che hanno subito le gelate, si nota una significativa ripresa vegetativa; si consiglia pertanto di iniziare anche in quei casi i lavori di scacchiatura al fine di stimolare l'accrescimento dei germogli utili alla potatura per il prossimo inverno.