



## 30/06/2017

Il Protocollo Viticolo edizione 2017 è disponibile presso gli uffici del Consorzio di Tutela. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è **attivo lo Sportello Viticolo con il cell 389 5220220 e la mail [gruppotecnico@prosecco.it](mailto:gruppotecnico@prosecco.it) al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.**

### **METEO**

La fase instabile prevista per metà settimana ha portato precipitazioni diffuse e consistenti, talvolta di forte intensità, nelle giornate di mercoledì e giovedì. Il meteo resterà tendenzialmente variabile nel corso dei prossimi giorni, con ampi tratti soleggiati ma con possibili annuvolamenti e precipitazioni di lieve intensità soprattutto nel pomeriggio di venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio. Le temperature si attesteranno su valori leggermente inferiori alla media del periodo. A partire da domenica, secondo le previsioni attualmente disponibili, le condizioni meteo dovrebbero stabilizzarsi in modo più costante. Per ogni dettaglio, è possibile consultare il link [http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo\\_veneto.php](http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php) quale fonte dati dei nostri comunicati.

Per accedere alla consultazione delle centraline distribuite all'interno della Denominazione, è possibile inserire il seguente indirizzo sul browser **88.149.188.186/docg/mappa.html**.

**Si ricorda che il nome utente è "docg", mentre la password "d4cg".**

### **OSSERVAZIONI IN CAMPO**

#### **Fenologia - situazione al 26.06.2017**

| <b>LOCALITÀ</b>     | <b>FENOLOGIA GRAPPOLO</b>                |
|---------------------|--|
| Carpesica           | Le bacche iniziano a toccarsi            |
| Cartizze            | Le bacche iniziano a toccarsi            |
| Col San Martino     | Le bacche iniziano a toccarsi            |
| Colbertaldo         | Le bacche iniziano a toccarsi            |
| Colfosco            | Le bacche iniziano a toccarsi            |
| Collalto            | Le bacche iniziano a toccarsi            |
| Colle Umberto       | Le bacche iniziano a toccarsi            |
| Combai              | Le bacche iniziano a toccarsi            |
| Conegliano          | Le bacche iniziano a toccarsi            |
| Premaor             | Bacche delle dimensioni di pisello       |
| Refrontolo          | La maggior parte delle bacche si toccano |
| Rolle Medio         | Le bacche iniziano a toccarsi            |
| S. Maria di Feletto | Le bacche iniziano a toccarsi            |
| Soligo              | Le bacche iniziano a toccarsi            |
| Valdobbiadene       | Le bacche iniziano a toccarsi            |



**PROTOCOLLO  
VITICOLO** DEL  
CONEGLIANO VALDOBBIADENE  
PROSECCO SUPERIORE DOCG

# BOLLETTINO AGRONOMICO

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

## ***Peronospora – Plasmopara viticola***

In seguito alle piovosità riscontrate i sistemi previsionali indicano un dilavamento consistente dei prodotti fitosanitari impiegati nell'ultimo intervento consigliato. Pertanto, si consiglia di intervenire ripristinando la copertura della vegetazione e dei grappoli tra venerdì 30 giugno e domenica 2 luglio secondo la seguente strategia:

**poltiglia bordolese** alla dose di **2 kg/ha**

+

**idrossido di rame** alla dose di:

- **1 kg/ha** (nel caso il prodotto impiegato contenga il **35%** di rame metallo)
- **2 kg/ha** (nel caso il prodotto impiegato contenga il **20%** di rame metallo)

Per le zone che hanno fasi fenologiche inferiori a quelle descritte in tabella si consiglia di intervenire con:

**Zoxamide + rame**

oppure

**Mandipropamide + rame**

in entrambe i casi a dosi di etichetta e rispettando i limiti suggeriti dal Protocollo Viticolo.

## ***Oidio – Erysiphe necator***

In seguito agli eventi piovosi verificatesi la pressione di malattia del patogeno risulta essere medio bassa; tuttavia, in seguito al dilavamento dei prodotti fitosanitari impiegati nell'ultimo intervento è bene ripristinare la copertura secondo la seguente strategia:

**Zolfo bagnabile** alla dose di **5 kg/ha**.

Per le zone che hanno fasi fenologiche inferiori a quelle descritte in tabella si consiglia di intervenire con:

**Zolfo bagnabile** alla dose di 5 kg/ha

+

**Quinoxifen o Cyflufenamid** (in alternanza al precedente trattamento), alla dose per ha indicata in etichetta.



**PROTOCOLLO  
VITICOLO** DEL  
CONEGLIANO VALDOBBIADENE  
PROSECCO SUPERIORE DOCG

# BOLLETTINO AGRONOMICO

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

## ***GESTIONE IN VERDE***

Dato lo stadio fenologico raggiunto sia dalla vegetazione che dal grappolo è opportuno continuare le operazioni di sfemminellatura in fascia grappoli per ridurre gli eventuali affastellamenti e consentire un'adeguata areazione. Inoltre, è bene mantenere le pareti ordinate attraverso la cimatura per consentire una corretta ed uniforme bagnatura della vegetazione e dei grappoli con il trattamento suggerito.

## ***INSETTI***

Per coloro i quali non avessero ancora effettuato il trattamento insetticida si consiglia di intervenire con i principi attivi e nei tempi suggeriti dai precedenti bollettini.

Inoltre, qualsiasi trattamento insetticida va eseguito solo ed esclusivamente dopo l'avvenuto sfalcio dell'erba associato a qualsiasi altro accorgimento volto a salvaguardare l'entomofauna utile.