



PROSECCO SUPERIORE
DAL 1876

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE 18° Bollettino Agronomico del 02/08/2016

E' attivo lo Sportello Viticolo con il cell 389 5220220 e la mail gruppotecnico@prosecco.it al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.

STATO FENOLOGICO

Le piogge sparse di giovedì 28 pomeriggio e quelle di domenica, accompagnate da leggere grandinate nella zona di Refrontolo (giovedì) e Col San Martino, Colbertaldo e Valdobbiadene (domenica), favoriscono il progresso fenologico della vite che si approssima oramai e finalmente all'invaiaura. Nei prossimi giorni il tempo rimarrà stabile almeno fino al weekend quando sono previsti alcuni temporali. In generale comunque si mantiene un certo ritardo nella fenologia per l'intera area del Conegliano Valdobbiadene pari a circa 7 giorni.

Per il progresso fenologico si riporta la tabella con il dettaglio delle stazioni monitorate settimanalmente:

Località	Fenologia grappolo
Carpesica	la maggior parte delle bacche si toccano*
Cartizze	la maggior parte delle bacche si toccano*
Col S. Martino	la maggior parte delle bacche si toccano*
Colbertaldo	la maggior parte delle bacche si toccano*
Colfosco	Inizio invaiatura
Collalto	la maggior parte delle bacche si toccano*
Colle Umberto	Inizio invaiatura
Combai	la maggior parte delle bacche si toccano*
Conegliano	Inizio invaiatura
Premaor	la maggior parte delle bacche si toccano*
Refrontolo	la maggior parte delle bacche si toccano*
Rolle medio	la maggior parte delle bacche si toccano*
S. Maria di Felfeto	la maggior parte delle bacche si toccano*
Soligo	la maggior parte delle bacche si toccano*
Valdobbiadene	la maggior parte delle bacche si toccano*

PERONOSPORA – *Plasmopara viticola*

Stima rischio infezione Medio

Le piogge di giovedì e domenica hanno determinato il dilavamento della copertura rameica suggerita nell'ultimo intervento. In considerazione della pressione della malattia che non sembra cessare e del costante rischio di bagnature fogliari dovute a rugiada o temporali improvvisi, si consiglia di ripristinare quanto prima la copertura con un intervento a base di **prodotti rameici tipo 1,5 Kg a ettaro di poltiglia bordolese al 20% ed 1,5 Kg ad ettaro di idrossido al 20%**.

OIDIO – *Erysiphe necator*

Stima rischio infezione Basso

Sulla base delle indicazioni dei sistemi previsionali e dell'avvicinarsi ormai dell'invaiaura possiamo considerare ridotta la pressione del fungo. Si consiglia pertanto di distribuire per la **conduzione biologica e convenzionale zolfo bagnabile al dosaggio di 4 Kg/ha**

GESTIONE IN VERDE

Qualora il carico d'uva risultasse eccessivo per una corretta maturazione e per il raggiungimento degli standard qualitativi prefissati (zuccheri, acidità), si consiglia di eseguire un intervento di diradamento. L'intervento deve consentire la separazione dei grappoli appressati e quindi un adeguato arieggiamento per diminuire la pressione delle malattie, botrite e marciume acido, soprattutto in vista di possibili piogge e temporali agostani.

Villa Brandolini, Solighetto - 31053 Pieve di Soligo Tel. 0438 83028 - Fax 0438 842700 Via Roma, 7
Internet: www.prosecco.it

E-mail gruppotecnico@prosecco.it

Cell 389 5220220