



03/08/2017

Il Protocollo Viticolo edizione 2017 è disponibile presso gli uffici del Consorzio di Tutela. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è **attivo lo Sportello Viticolo con il cell 389 5220220 e la mail gruppotecnico@prosecco.it al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.**

METEO

Temperature molto sopra la norma del periodo per il resto della settimana. Il tempo resterà stabile e in prevalenza soleggiato fino a sabato. Domenica 6 l'area anticiclonica inizierà a cedere permettendo un primo ingresso di correnti atlantiche più fresche, che porteranno una breve fase di instabilità con probabili precipitazioni prevalentemente a carattere di rovescio o temporale.

Per ogni dettaglio, si può consultare il link http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php quale fonte dati dei nostri comunicati.

Per accedere alla consultazione delle centraline distribuite all'interno della Denominazione, è possibile inserire il seguente indirizzo sul browser **88.149.188.186/docg/mappa.html**.

Si ricorda che il nome utente è "docg", mentre la password "d4cg".

OSSERVAZIONI IN CAMPO

Fenologia - situazione al 31.07.2017

LOCALITÀ	FENOLOGIA GRAPPOLO
Carpesica	50% dell'invaiaatura
Cartizze	25% dell'invaiaatura
Col San Martino	25% dell'invaiaatura
Colbertaldo	25% dell'invaiaatura
Colfosco	75% dell'invaiaatura
Collalto	25% dell'invaiaatura
Colle Umberto	75% dell'invaiaatura
Combai	Inizio invaiatura
Conegliano	50% dell'invaiaatura
Premaor	Inizio invaiatura
Refrontolo	75% dell'invaiaatura
Rolle Medio	Inizio invaiatura
S. Maria di Feletto	50% dell'invaiaatura
Soligo	50% dell'invaiaatura
Valdobbiadene	Inizio invaiatura



**PROTOCOLLO
VITICOLO** DEL
CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE DOCG

BOLLETTINO AGRONOMICO

CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE

Peronospora – Plasmopara viticola

Date le piogge previste tra domenica e lunedì si consiglia di ripristinare la copertura entro il fine settimana secondo la strategia di seguito indicata:

Poltiglia bordolese alla dose di 2 kg/ha

NB: Negli appezzamenti dove si riscontra un'invasione molto avanzata è consigliabile irrorare solo la parte superiore della chioma escludendo così la fascia grappoli.

Oidio – Erysiphe necator

I modelli previsionali indicano una pressione infettiva medio-bassa del patogeno in questione. Tuttavia si consiglia di ripristinare la protezione negli stessi tempi indicati per la peronospora con:

Zolfo bagnabile alla dose di 3 kg/ha

GESTIONE IN VERDE

Si ricorda che è sempre buona norma mantenere le pareti ordinate attraverso la cimatura per consentire una corretta ed uniforme bagnatura della vegetazione e dei grappoli con il trattamento suggerito.