



**CONSORZIO TUTELA CONEGLIANO VALDOBBIADENE**

## **12° Bollettino Agronomico del 22/06/2018**

Il Protocollo Viticolo edizione 2018 è disponibile presso gli uffici del Consorzio di Tutela ed è stato recapitato presso tutte le sedi delle aziende agricole del territorio in modo da consentire una capillare presenza ed informazione alle aziende vitivinicole che intendono adottarlo. Per fornire al meglio l'assistenza tecnica alle aziende del Conegliano Valdobbiadene si informa che è **attivo lo Sportello Viticolo con la mail [gruppotecnico@prosecco.it](mailto:gruppotecnico@prosecco.it) e il cell 389 5220220 al quale potete chiamare dalle 8.30 alle 18.00. Nel caso in cui non riceviate alcuna risposta, l'utente verrà ricontattato.**

Inoltre, per coloro che volessero ricevere i bollettini, si prega di comunicare alla casella mail sopra riportata l'indirizzo di posta elettronica cui inviare i comunicati settimanali.

### **METEO**

L'alta pressione delle Azzorre è in fase di cedimento per l'arrivo di una perturbazione accompagnata da aria fresca di origine nord atlantica. Questo impulso perturbato determinerà dei temporali e da venerdì un significativo calo termico. In seguito la pressione tenderà nuovamente ad aumentare con rasserenamenti alternati a qualche fase nuvolosa e temperature che si manterranno al di sotto delle medie stagionali.

(Fonte: Arpav Meteo Regionale [www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it))

Per ogni dettaglio, si può consultare il link [http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo\\_veneto.php](http://www.arpa.veneto.it/previsioni/it/html/meteo_veneto.php) quale fonte dati dei nostri comunicati.

Per accedere alla consultazione delle centraline distribuite all'interno della Denominazione, è possibile inserire il seguente indirizzo sul browser **88.149.188.186/docg/mappa.html**. Si ricorda che il nome utente è "docg", mentre la password "d4cg".

## FENOLOGIA

I rilievi fenologici effettuati lunedì 18 giugno evidenziano che gli acini hanno raggiunto le dimensioni di un grano di pisello in molte località ad eccezione di Premaor, mentre nelle zone tradizionalmente più precoci le bacche iniziano a toccarsi.

In tabella il dettaglio dei rilievi:

LOCALITÀ	FENOLOGIA GRAPPOLO 18/06/2018
Capesica	le bacche iniziano a toccarsi
Cartizze	bacche delle dimensioni di un pisello
Col San Martino	bacche delle dimensioni di un pisello
Colbertaldo	bacche delle dimensioni di un pisello
Colfosco	le bacche iniziano a toccarsi
Collalto	le bacche iniziano a toccarsi
Colle Umberto	le bacche iniziano a toccarsi
Combai	bacche delle dimensioni di un pisello
Conegliano	le bacche iniziano a toccarsi
Premaor	bacche delle dimensioni tra grano di pepe e pisello
Refrontolo	le bacche iniziano a toccarsi
Rolle	bacche delle dimensioni di un pisello
S. Maria di Filetto	le bacche iniziano a toccarsi
Soligo	le bacche iniziano a toccarsi
Valdobbiadene	bacche delle dimensioni di un pisello

## DIFESA

### Protocollo Viticolo

#### PERONOSPORA

Secondo i modelli previsionali abbinati alle centraline meteo distribuite nel territorio, il trattamento consigliato in data 13 giugno garantisce la protezione della vegetazione dalle piogge del fine settimana. Successivamente, si consiglia di sfruttare il primo momento utile per ripristinare la protezione della chioma. Visto lo stadio raggiunto dagli acini, si ritiene che la suscettibilità dei grappoli alle infezioni peronosporiche sia in calo e pertanto da questa fase si consiglia l'impiego dei seguenti prodotti rameici:

**ossicloruro di rame** a metà della dose minima di etichetta

+

**idrossido di rame** a metà della dose minima di etichetta

Per i vigneti posizionati in zone sensibili alla peronospora quali fondovalle o zone particolarmente umide si suggerisce di aggiungere alla miscela sopracitata una molecola appartenente alla classe dei CAA (Dimetomorph, mandipropamide, iprovalicarb, ecc.). Oppure, in alternativa al rame + CAA, impiegare o **zoxamide** o **cyazofamide**.

## **OIDIO**

Di pari passo alla peronospora, per l'oidio si consiglia di effettuare il trattamento con:

**zolfo bagnabile** alla dose minima di 5 kg/ha

In abbinamento ai CAA o zoxamide o cyazofamide aggiungere anche un prodotto a base **Quinoxifen**.

NB: Per chi avesse riscontrato problemi nel proprio vigneto si consiglia di contattare il gruppo tecnico al numero **389 5220220**, al fine di stabilire una strategia di difesa mirata al contenimento delle infezioni in corso.

## **Viticultura Biologica**

Ripristinare la copertura prima delle prossime piogge con prodotti rameici sotto forma di:

-**ossicloruro di rame** alla dose di 200 g/ha di rame metallo

-**idrossido di rame** alla dose di 200 g/ha di rame metallo

In abbinamento aggiungere **Zolfo bagnabile** alla dose minima di 5 kg/ha.

## **INSETTI**

### **TIGNOLE**

Nelle trappole a feromone distribuite nel territorio della Denominazione le catture di *Lobesia botrana* e *Eupoecilia ambiguella*, rispettivamente tignoletta e tignola della vite, continuano ad essere molto scarse. Ad oggi, si mantiene basso il rischio di attacchi di questi fitofagi, tale da non suggerire alcun intervento insetticida specifico. Il monitoraggio andrà avanti ancora nei prossimi giorni, e qualora le catture dovessero aumentare in modo sensibile, sarà emessa una nuova comunicazione.

### **SCAPHOIDEUS TITANUS**

I monitoraggi eseguiti nel territorio evidenziano la presenza dell'insetto allo stadio di neanide di 2a, 3a e 4a età. Per coloro i quali non fossero ancora intervenuti si consiglia

di eseguire il trattamento fitosanitario specifico al massimo nei prossimi giorni, secondo le indicazioni fornite nel precedente bollettino.

### **GESTIONE IN VERDE**

Dato lo stadio fenologico raggiunto sia dalla vegetazione che dal grappolo è opportuno iniziare le operazioni di sfemminellatura/sfogliatura in fascia grappoli per ridurre gli eventuali affastellamenti, consentire un'adeguata areazione e la corretta ed uniforme bagnatura.